

# Funkce a limita

Petr Hasil

Přednáška z matematiky



- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce

- 2 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Limita funkce
  - Spojitost funkce
  - Výpočet limit

- 3 Příklady

- 4 Wolfram|Alpha

# Obsah

## 1 Funkce II

- Přehled elementárních funkcí
- Operace s funkcemi
- Inverzní funkce
- Transformace grafu funkce

## 2 Limita funkce

- Okolí bodu
- Limita funkce
- Spojitost funkce
- Výpočet limit

## 3 Příklady

## 4 Wolfram|Alpha

## Definice (Základní elementární funkce)


Obecná mocnina, mnohočleny, goniometrické, cyklometrické, exponenciální a logaritmické (a hyperbolické a hyperbolometrické) funkce se nazývají *základní elementární funkce*.



### Definice (Základní elementární funkce)


Obecná mocnina, mnohočleny, goniometrické, cyklometrické, exponenciální a logaritmické (a hyperbolické a hyperbolometrické) funkce se nazývají *základní elementární funkce*.

### Definice (Elementární funkce)


Funkce, které lze získat konečným počtem sečtení, odečtení, vynásobení, dělení a složení základních elementárních funkcí se nazývají *elementární funkce*.



Obr.:  $x^2$


Obr.:  $x^2$ Obr.:  $x^2, x^4$


Obr.:  $x^2$ ,  $\sqrt{x}$





Obr.:  $x^3$


Obr.:  $x^3$ Obr.:  $x^3, x^5$

Obr.:  $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{x^2}$






Obr.:  $2^x$ ,  $(\frac{1}{2})^x$

Obr.:  $2^x$ ,  $(\frac{1}{2})^x$ Obr.:  $\log_2 x$ ,  $\log_{\frac{1}{2}} x$





Obr.:  $2^x$ ,  $(\frac{1}{2})^x$ ,  $\log_2 x$ ,  $\log_{\frac{1}{2}} x$


Obr.:  $\sin x$


Obr.:  $\sin x$ Obr.:  $\cos x$






Obr.:  $\sin x$ ,  $\cos x$


Obr.:  $\sin x$ ,  $\arcsin x$


Obr.:  $\cos x$ ,  $\arccos x$

Obr.:  $\operatorname{tg} x$

Obr.:  $\operatorname{tg} x$ Obr.:  $\operatorname{cotg} x$

Obr.:  $\operatorname{tg} x$ ,  $\operatorname{cotg} x$

Obr.:  $\operatorname{tg} x$ ,  $\operatorname{arctg} x$

Obr.:  $\cot g x$ ,  $\text{arccotg } x$



# Obsah

## 1 Funkce II

- Přehled elementárních funkcí
- **Operace s funkcemi**
- Inverzní funkce
- Transformace grafu funkce

## 2 Limita funkce

- Okolí bodu
- Limita funkce
- Spojitost funkce
- Výpočet limit

## 3 Příklady

## 4 Wolfram|Alpha

## Operace s funkcemi

- Platí

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

## Operace s funkcemi

- Platí

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Definiční obor těchto funkcí je průnikem definičních oborů původních funkcí, tj.

$$D(f \pm g) = D(f) \cap D(g) = D(f \cdot g).$$

## Operace s funkcemi

- Platí

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Definiční obor těchto funkcí je průnikem definičních oborů původních funkcí, tj.

$$D(f \pm g) = D(f) \cap D(g) = D(f \cdot g).$$

- Platí

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

## Operace s funkcemi

- Platí

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$
$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Definiční obor těchto funkcí je průnikem definičních oborů původních funkcí, tj.

$$D(f \pm g) = D(f) \cap D(g) = D(f \cdot g).$$

- Platí

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Definiční obor nové funkce je průnikem definičních oborů funkcí  $f$  a  $g$  zúžený o body, v nichž je  $g(x) = 0$ , tj.

$$D\left(\frac{f}{g}\right) = D(f) \cap D(g) \setminus \{x : g(x) = 0\}.$$

Další operací je skládání funkcí.

Další operací je skládání funkcí.

### Definice (Složená funkce)

Nechť  $u = g(x)$  je funkce s definičním oborem  $D(g)$  a oborem hodnot  $H(g)$ . Nechť  $y = f(u)$  je funkce s definičním oborem  $D(f) \supseteq H(g)$ .

Další operací je skládání funkcí.

### Definice (Složená funkce)

Nechť  $u = g(x)$  je funkce s definičním oborem  $D(g)$  a oborem hodnot  $H(g)$ . Nechť  $y = f(u)$  je funkce s definičním oborem  $D(f) \supseteq H(g)$ .

*Složenou funkcí*  $(f \circ g)(x)$  rozumíme přiřazení, které  $\forall x \in D(g)$  přiřadí  $y = f(u) = f(g(x))$ . Funkci  $g$  nazýváme vnitřní složkou a funkci  $f$  vnější složkou složené funkce.




Další operací je skládání funkcí.

### Definice (Složená funkce)

Nechť  $u = g(x)$  je funkce s definičním oborem  $D(g)$  a oborem hodnot  $H(g)$ . Nechť  $y = f(u)$  je funkce s definičním oborem  $D(f) \supseteq H(g)$ .

*Složenou funkcí*  $(f \circ g)(x)$  rozumíme přiřazení, které  $\forall x \in D(g)$  přiřadí  $y = f(u) = f(g(x))$ . Funkci  $g$  nazýváme vnitřní složkou a funkci  $f$  vnější složkou složené funkce.



## Příklad

- Funkce

$$F(x) = \sin x^2$$

je složena z funkcí  $f(x) = \sin x$  a  $g(x) = x^2$  tak, že

$$F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

## Příklad

- Funkce

$$F(x) = \sin x^2$$

je složena z funkcí  $f(x) = \sin x$  a  $g(x) = x^2$  tak, že

$$F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

- Funkce

$$G(x) = \sqrt[3]{e^{2x-4}}$$

je složena z funkcí  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ,  $g(x) = e^x$ ,  $h(x) = 2x - 4$  tak, že

$$G(x) = (f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))).$$

### Poznámka

Při určování definičních oborů složených funkcí je vhodné postupovat zevnitř. Každý definiční obor je průnikem všech získaných podmínek. Např. je-li  $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , najdeme nejprve  $D(f)$ , poté zjistíme, ve kterých bodech je  $f(x) < 0$  a ty odstraníme, tj.

$$D(F) = D(f) \setminus \{x : f(x) < 0\}.$$

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např.  
u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,
- $F(x) = \log_a f(x)$ , že  $f(x) > 0$ ,

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,
- $F(x) = \log_a f(x)$ , že  $f(x) > 0$ ,
- $F(x) = \operatorname{tg} f(x)$ , že  $f(x) \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,



Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,
- $F(x) = \log_a f(x)$ , že  $f(x) > 0$ ,
- $F(x) = \operatorname{tg} f(x)$ , že  $f(x) \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- $F(x) = \operatorname{cotg} f(x)$ , že  $f(x) \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,
- $F(x) = \log_a f(x)$ , že  $f(x) > 0$ ,
- $F(x) = \operatorname{tg} f(x)$ , že  $f(x) \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- $F(x) = \operatorname{cotg} f(x)$ , že  $f(x) \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- $F(x) = \arcsin f(x)$ , že  $f(x) \in [-1, 1]$ ,

Tedy mimo definiční obory základních funkcí musíme brát v úvahu např. u funkce

- $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , že  $g(x) \neq 0$ ,
- $F(x) = \sqrt{f(x)}$ , že  $f(x) \geq 0$ ,
- $F(x) = \log_a f(x)$ , že  $f(x) > 0$ ,
- $F(x) = \operatorname{tg} f(x)$ , že  $f(x) \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- $F(x) = \operatorname{cotg} f(x)$ , že  $f(x) \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- $F(x) = \arcsin f(x)$ , že  $f(x) \in [-1, 1]$ ,
- $F(x) = \arccos f(x)$ , že  $f(x) \in [-1, 1]$ .

# Obsah

## 1 Funkce II

- Přehled elementárních funkcí
- Operace s funkcemi
- **Inverzní funkce**
- Transformace grafu funkce

## 2 Limita funkce

- Okolí bodu
- Limita funkce
- Spojitost funkce
- Výpočet limit

## 3 Příklady

## 4 Wolfram|Alpha

## Definice (Prostá funkce)

Nechť  $f$  je funkce a  $M \subseteq D(f)$ . Řekneme, že funkce  $f$  je na množině  $M$  *prostá*, jestliže pro každou dvojici  $x_1, x_2 \in M$  platí

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$


## Definice (Prostá funkce)

Nechť  $f$  je funkce a  $M \subseteq D(f)$ . Řekneme, že funkce  $f$  je na množině  $M$  **prostá**, jestliže pro každou dvojici  $x_1, x_2 \in M$  platí

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

## Poznámka

- Graf prosté funkce protíná všechny vodorovné přímky nejvýše jednou.





## Definice (Prostá funkce)

Nechť  $f$  je funkce a  $M \subseteq D(f)$ . Řekneme, že funkce  $f$  je na množině  $M$  **prostá**, jestliže pro každou dvojici  $x_1, x_2 \in M$  platí

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

## Poznámka

- Graf prosté funkce protíná všechny vodorovné přímky nejvýše jednou.





## Definice (Prostá funkce)

Nechť  $f$  je funkce a  $M \subseteq D(f)$ . Řekneme, že funkce  $f$  je na množině  $M$  **prostá**, jestliže pro každou dvojici  $x_1, x_2 \in M$  platí

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

## Poznámka

- Graf prosté funkce protíná všechny vodorovné přímky nejvýše jednou.



- Je-li funkce na množině  $M$  ryze monotónní, pak je na ní prostá.




## Definice (Inverzní funkce)

Nechť  $f$  je prostá funkce. Funkci  $f^{-1}$ , která každému  $y \in H(f)$  přiřazuje právě to  $x$ , pro které platí  $y = f(x)$ , se nazývá inverzní funkcí k funkci  $f$ . Píšeme  $x = f^{-1}(y)$ .

## Definice (Inverzní funkce)

Nechť  $f$  je prostá funkce. Funkci  $f^{-1}$ , která každému  $y \in H(f)$  přiřazuje právě to  $x$ , pro které platí  $y = f(x)$ , se nazývá inverzní funkcí k funkci  $f$ . Píšeme  $x = f^{-1}(y)$ .



## Platí

- $D(f^{-1}) = H(f)$ ,  $H(f^{-1}) = D(f)$ , je-li funkce prostá

## Platí

- $D(f^{-1}) = H(f)$ ,  $H(f^{-1}) = D(f)$ , je-li funkce prostá
- $(f^{-1})^{-1} = f$ .

## Platí


- $D(f^{-1}) = H(f)$ ,  $H(f^{-1}) = D(f)$ , je-li funkce prostá
- $(f^{-1})^{-1} = f$ .
- Grafy funkcí  $f$  a  $f^{-1}$  jsou symetrické podle osy I. a III. kvadrantu (přímky  $y = x$ ).

## Platí

- $D(f^{-1}) = H(f)$ ,  $H(f^{-1}) = D(f)$ , je-li funkce prostá
- $(f^{-1})^{-1} = f$ .
- Grafy funkcí  $f$  a  $f^{-1}$  jsou symetrické podle osy I. a III. kvadrantu (přímky  $y = x$ ).
- Je-li funkce  $f$  rostoucí/klesající, je také funkce  $f^{-1}$  rostoucí/klesající.

## Platí

- $D(f^{-1}) = H(f)$ ,  $H(f^{-1}) = D(f)$ , je-li funkce prostá
- $(f^{-1})^{-1} = f$ .
- Grafy funkcí  $f$  a  $f^{-1}$  jsou symetrické podle osy I. a III. kvadrantu (přímky  $y = x$ ).
- Je-li funkce  $f$  rostoucí/klesající, je také funkce  $f^{-1}$  rostoucí/klesající.



## Výpočet inverzní funkce

Inverzní funkci k funkci  $f$  určíme tak, že v předpisu  $y = f(x)$  zaměníme proměnné  $x$  a  $y$ , tím dostaneme  $x = f(y)$ . Z této rovnice pak vyjádříme, je-li to možné, proměnnou  $y$ .



## Výpočet inverzní funkce

Inverzní funkci k funkci  $f$  určíme tak, že v předpisu  $y = f(x)$  zaměníme proměnné  $x$  a  $y$ , tím dostaneme  $x = f(y)$ . Z této rovnice pak vyjádříme, je-li to možné, proměnnou  $y$ .

K elementární funkci je inverzní funkcí jiná elementární funkce:

$f(x)$	$f^{-1}(x)$
$x^2 \quad (x \geq 0)$	$\sqrt{x}$
$x^2 \quad (x \leq 0)$	$-\sqrt{x}$
$x^3$	$\sqrt[3]{x}$
$e^x$	$\ln x$
$a^x \quad (a \neq 1)$	$\log_a x$
$\sin x \quad (x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$	$\arcsin x$
$\cos x \quad (x \in [0, \pi])$	$\arccos x$
$\operatorname{tg} x \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$	$\operatorname{arctg} x$
$\operatorname{cotg} x \quad (x \in (0, \pi))$	$\operatorname{arccotg} x$

## Poznámka

Pro všechna  $x$ , pro která má zápis smysl, platí

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x.$$

## Poznámka

Pro všechna  $x$ , pro která má zápis smysl, platí

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x.$$

## Příklad

Určete inverzní funkci k funkci  $f$  a určete  $D(f)$ ,  $H(f)$ ,  $D(f^{-1})$  a  $H(f^{-1})$ .

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$ ,

- $f(x) = e^{\sin x}$ .

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2}$$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$
$$2x = 3y - 4$$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$

$$2x = 3y - 4$$

$$3y = 2x + 4$$



- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$

$$2x = 3y - 4$$

$$3y = 2x + 4$$

$$y = \frac{2x+4}{3}$$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$

$$2x = 3y - 4$$

$$3y = 2x + 4$$

$$y = \frac{2x+4}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{2x+4}{3}.$$

- $f(x) = \frac{3x-4}{2}$

$$y = \frac{3x-4}{2} \rightsquigarrow x = \frac{3y-4}{2}$$

$$2x = 3y - 4$$

$$3y = 2x + 4$$

$$y = \frac{2x+4}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{2x+4}{3}.$$

$$D(f) = H(f) = D(f^{-1}) = H(f^{-1}) = \mathbb{R}.$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x}$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y}$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$
$$\ln x = \sin y$$



- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$
$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$$D(f) = \mathbb{R}, \text{ funkce } f \text{ je prostá pro } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1}),$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$  :

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \quad / e^{(\cdot)}$$



- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \quad / e^{(\cdot)} \quad \Rightarrow \quad e^{-1} \leq x \leq e$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \quad / e^{(\cdot)} \quad \Rightarrow \quad e^{-1} \leq x \leq e \quad \Rightarrow \quad x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \quad / e^{(\cdot)} \quad \Rightarrow \quad e^{-1} \leq x \leq e \quad \Rightarrow \quad x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$$

$$D(f^{-1}) = (0, \infty) \cap \left[\frac{1}{e}, e\right] = \left[\frac{1}{e}, e\right].$$

- $f(x) = e^{\sin x}$

$$y = e^{\sin x} \quad \rightsquigarrow \quad x = e^{\sin y} \quad / \ln(\cdot)$$

$$\ln x = \sin y \quad / \arcsin(\cdot)$$

$$\arcsin \ln x = y \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(x) = \arcsin \ln x.$$

$D(f) = \mathbb{R}$ , funkce  $f$  je prostá pro  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = H(f^{-1})$ ,

$D(f^{-1})$ :

- $\ln x \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x \in (0, \infty)$
- $\arcsin \ln x \Rightarrow \ln x \in [-1, 1]$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \quad / e^{(\cdot)} \quad \Rightarrow \quad e^{-1} \leq x \leq e \quad \Rightarrow \quad x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$$

$$D(f^{-1}) = (0, \infty) \cap \left[\frac{1}{e}, e\right] = \left[\frac{1}{e}, e\right].$$

$$\text{Celkem tedy } H(f) = D(f^{-1}) = \left[\frac{1}{e}, e\right].$$

# Obsah

## 1 Funkce II

- Přehled elementárních funkcí
- Operace s funkcemi
- Inverzní funkce
- **Transformace grafu funkce**

## 2 Limita funkce

- Okolí bodu
- Limita funkce
- Spojitost funkce
- Výpočet limit

## 3 Příklady

## 4 Wolfram|Alpha

## Transformace grafu funkce

Nechť je dána funkce  $y = f(x)$  a nenulová reálná čísla  $a, b$ .

## Transformace grafu funkce


Nechť je dána funkce  $y = f(x)$  a nenulová reálná čísla  $a, b$ .

- Uvažujme funkci  $\tilde{y} = f(x + a)$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď doleva (je-li  $a > 0$ ), nebo doprava (pro  $a < 0$ ), a to o velikost čísla  $a$ .

## Transformace grafu funkce

Nechť je dána funkce  $y = f(x)$  a nenulová reálná čísla  $a, b$ .

- Uvažujme funkci  $\tilde{y} = f(x + a)$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď doleva (je-li  $a > 0$ ), nebo doprava (pro  $a < 0$ ), a to o velikost čísla  $a$ .




Obr.:  $f(x) = (x + 1)^3$



## Transformace grafu funkce

Nechť je dána funkce  $y = f(x)$  a nenulová reálná čísla  $a, b$ .

- Uvažujme funkci  $\tilde{y} = f(x + a)$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď doleva (je-li  $a > 0$ ), nebo doprava (pro  $a < 0$ ), a to o velikost čísla  $a$ .
- Uvažujme funkci  $\hat{y} = f(x) + b$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď nahoru (je-li  $b > 0$ ), nebo dolů (pro  $b < 0$ ), a to o velikost čísla  $b$ .




Obr.:  $f(x) = (x + 1)^3$


## Transformace grafu funkce

Nechť je dána funkce  $y = f(x)$  a nenulová reálná čísla  $a, b$ .

- Uvažujme funkci  $\tilde{y} = f(x + a)$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď doleva (je-li  $a > 0$ ), nebo doprava (pro  $a < 0$ ), a to o velikost čísla  $a$ .
- Uvažujme funkci  $\hat{y} = f(x) + b$ . Tato funkce má vůči původní funkci graf posunutý buď nahoru (je-li  $b > 0$ ), nebo dolů (pro  $b < 0$ ), a to o velikost čísla  $b$ .



Obr.:  $f(x) = (x + 1)^3$



Obr.:  $f(x) = x^3 + 1$

# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce

- 2 Limita funkce
  - **Okolí bodu**
  - Limita funkce
  - Spojitost funkce
  - Výpočet limit

- 3 Příklady

- 4 Wolfram|Alpha

### Definice (Okolí bodu)

Libovolný otevřený interval  $I \in \mathbb{R}$  obsahující bod  $x_0 \in \mathbb{R}$  nazýváme *okolí bodu*  $x_0$  označíme jej  $\mathcal{O}(x_0)$ .

## Speciální typy okolí bodu

- $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

## Speciální typy okolí bodu

- $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

- Prstencové (ryzí)  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\widehat{\mathcal{O}}_\delta(x_0) = \mathcal{O}_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).$$

## Speciální typy okolí bodu

- $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

- Prstencové (ryzí)  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\widehat{\mathcal{O}}_\delta(x_0) = \mathcal{O}_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).$$

- Levé a pravé  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0], \quad \mathcal{O}_\delta^+(x_0) = [x_0, x_0 + \delta).$$

## Speciální typy okolí bodu

- $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

- Prstencové (ryzí)  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\widehat{\mathcal{O}}_\delta(x_0) = \mathcal{O}_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).$$

- Levé a pravé  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\mathcal{O}_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0], \quad \mathcal{O}_\delta^+(x_0) = [x_0, x_0 + \delta).$$

- Levé a pravé prstencové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

$$\widehat{\mathcal{O}}_\delta^-(x_0) = (x_0 - \delta, x_0), \quad \widehat{\mathcal{O}}_\delta^+(x_0) = (x_0, x_0 + \delta).$$



# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce

- 2 **Limita funkce**
  - Okolí bodu
  - **Limita funkce**
  - Spojitost funkce
  - Výpočet limit

- 3 Příklady

- 4 Wolfram|Alpha

## Definice (Limita funkce)

Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *limitu* rovnou číslu  $L$ , jestliže pro  $\forall \varepsilon > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro  $\forall x \in \hat{\mathcal{O}}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon(L)$ .


Píšeme

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L, \quad \text{popř.} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L.$$

## Definice (Limita funkce)

Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *limitu* rovnou číslu  $L$ , jestliže pro  $\forall \varepsilon > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro  $\forall x \in \hat{\mathcal{O}}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon(L)$ .  
Píšeme


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L, \quad \text{popř.} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L.$$



## Definice (Limita funkce)

Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *limitu* rovnou číslu  $L$ , jestliže pro  $\forall \varepsilon > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro  $\forall x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon(L)$ .  
Píšeme

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L, \quad \text{popř.} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L.$$



Nepřesně, ale ilustrativně:

*“Je-li  $x$  blízko  $x_0$ , pak je  $f(x)$  blízko  $L$ .”*

## Definice (Jednostranné limity)

Použijeme-li v definici limity  $\hat{O}_\delta^+(x_0)$  místo  $\hat{O}_\delta(x_0)$ , získáme definici *limity zprava*

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Definice (Jednostranné limity)

Použijeme-li v definici limity  $\widehat{O}_\delta^+(x_0)$  místo  $\widehat{O}_\delta(x_0)$ , získáme definici *limity zprava*

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

Podobně, použijeme-li v definici limity  $\widehat{O}_\delta^-(x_0)$  místo  $\widehat{O}_\delta(x_0)$ , získáme definici *limity zleva*

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

## Definice (Jednostranné limity)

Použijeme-li v definici limity  $\widehat{O}_\delta^+(x_0)$  místo  $\widehat{O}_\delta(x_0)$ , získáme definici *limitu zprava*

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

Podobně, použijeme-li v definici limity  $\widehat{O}_\delta^-(x_0)$  místo  $\widehat{O}_\delta(x_0)$ , získáme definici *limitu zleva*

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

## Věta (Jednoznačnost)

*Funkce má v každém bodě nejvýše jednu limitu / limitu zprava / limitu zleva.*

## Definice (Rozšířená množina reálných čísel)

*Rozšířenou množinou reálných čísel*  $\mathbb{R}^*$  rozumíme množinu reálných čísel  $\mathbb{R}$  rozšířenou o body  $-\infty$  a  $+\infty$ , tj

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$



## Definice (Rozšířená množina reálných čísel)

*Rozšířenou množinou reálných čísel*  $\mathbb{R}^*$  rozumíme množinu reálných čísel  $\mathbb{R}$  rozšířenou o body  $-\infty$  a  $+\infty$ , tj

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

Body  $\pm\infty$  nazýváme nevlastní body, zatímco body množiny  $\mathbb{R}$  nazýváme vlastní body.

Pro  $a \in \mathbb{R}$  definujeme:

$$\bullet a + \infty = \infty,$$

$$\bullet a - \infty = -\infty,$$

$$\bullet \infty + \infty = \infty,$$

$$\bullet -\infty - \infty = -\infty,$$

$$\bullet \infty \cdot \infty = \infty,$$

$$\bullet (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty,$$

$$\bullet \infty \cdot (-\infty) = -\infty,$$

$$\bullet |\pm \infty| = \infty,$$

$$\bullet \frac{a}{\pm \infty} = 0.$$

Pro  $a \in \mathbb{R}$  definujeme:

- $a + \infty = \infty,$

- $-\infty - \infty = -\infty,$

- $\infty \cdot (-\infty) = -\infty,$

- $a - \infty = -\infty,$

- $\infty \cdot \infty = \infty,$

- $|\pm \infty| = \infty,$

- $\infty + \infty = \infty,$

- $(-\infty) \cdot (-\infty) = \infty,$

- $\frac{a}{\pm \infty} = 0.$

- Je-li  $a > 0$ , pak  $a \cdot \infty = \infty, a \cdot (-\infty) = -\infty.$

- Je-li  $a < 0$ , pak  $a \cdot \infty = -\infty, a \cdot (-\infty) = \infty.$

Pro  $a \in \mathbb{R}$  definujeme:

- $a + \infty = \infty$ ,
- $a - \infty = -\infty$ ,
- $\infty + \infty = \infty$ ,
- $-\infty - \infty = -\infty$ ,
- $\infty \cdot \infty = \infty$ ,
- $(-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$ ,
- $\infty \cdot (-\infty) = -\infty$ ,
- $|\pm \infty| = \infty$ ,
- $\frac{a}{\pm \infty} = 0$ .
- Je-li  $a > 0$ , pak  $a \cdot \infty = \infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = -\infty$ .
- Je-li  $a < 0$ , pak  $a \cdot \infty = -\infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = \infty$ .

### Poznámka

Nejsou definovány výrazy

$$\infty - \infty, \quad \pm \infty \cdot 0, \quad \frac{\pm \infty}{\pm \infty}.$$

Tyto výrazy nazýváme *neurčité výrazy*.

Pro  $a \in \mathbb{R}$  definujeme:

- $a + \infty = \infty$ ,
- $a - \infty = -\infty$ ,
- $\infty + \infty = \infty$ ,
- $-\infty - \infty = -\infty$ ,
- $\infty \cdot \infty = \infty$ ,
- $(-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$ ,
- $\infty \cdot (-\infty) = -\infty$ ,
- $|\pm \infty| = \infty$ ,
- $\frac{a}{\pm \infty} = 0$ .
- Je-li  $a > 0$ , pak  $a \cdot \infty = \infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = -\infty$ .
- Je-li  $a < 0$ , pak  $a \cdot \infty = -\infty$ ,  $a \cdot (-\infty) = \infty$ .

### Poznámka

Nejsou definovány výrazy

$$\infty - \infty, \quad \pm \infty \cdot 0, \quad \frac{\pm \infty}{\pm \infty}.$$

Tyto výrazy nazýváme *neurčité výrazy*.

Samozřejmě není definováno dělení nulou.

### Definice (Okolí nevlastního bodu)

Okolím  $\mathcal{O}(\infty)$  bodu  $\infty$  rozumíme libovolný interval tvaru  $(a, \infty)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , a podobně okolím bodu  $-\infty$  interval tvaru  $(-\infty, a)$ . Ryzím okolím nevlastních bodů rozumíme totéž, co okolím těchto bodů.

### Definice (Okolí nevlastního bodu)

Okolím  $\mathcal{O}(\infty)$  bodu  $\infty$  rozumíme libovolný interval tvaru  $(a, \infty)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , a podobně okolím bodu  $-\infty$  interval tvaru  $(-\infty, a)$ . Ryzím okolím nevlastních bodů rozumíme totéž, co okolím těchto bodů.

Použitím okolí nevlastních bodů v definici limity získáme definici tzv. *nevlastní* limity a limity *v nevlastním bodě*. Definice limity se pak pro tyto speciální případy zjednoduší.


## Definice (Nevlastní limita)

Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *nevlastní limitu*  $+\infty$  ( $-\infty$ ), jestliže pro  $\forall Y > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro  $\forall x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) > Y$  ( $f(x) < -Y$ ).



## Definice (Nevlastní limita)

Řekneme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *nevlastní limitu*  $+\infty$  ( $-\infty$ ), jestliže pro  $\forall Y > 0$  existuje  $\delta > 0$  takové, že pro  $\forall x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) > Y$  ( $f(x) < -Y$ ).




## Definice (Limita v nevlastním bodě)

Řekneme, že funkce  $f$  má limitu  $L$  v nevlastním bodě  $+\infty$  ( $-\infty$ ), jestliže pro  $\forall \varepsilon > 0$  existuje  $X > 0$  takové, že pro  $\forall x > X$  ( $\forall x < -X$ ) platí  $f(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon(L)$ .

## Definice (Limita v nevlastním bodě)

Řekneme, že funkce  $f$  má limitu  $L$  v nevlastním bodě  $+\infty$  ( $-\infty$ ), jestliže pro  $\forall \varepsilon > 0$  existuje  $X > 0$  takové, že pro  $\forall x > X$  ( $\forall x < -X$ ) platí  $f(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon(L)$ .



## Použité pojmy

Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

## Použité pojmy

Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

- *vlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0, L \in \mathbb{R}$ ,

## Použité pojmy

Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

- *vlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0, L \in \mathbb{R}$ ,
- *nevlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0 \in \mathbb{R}, L \in \{\pm\infty\}$ ,

## Použité pojmy

### Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

- *vlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0, L \in \mathbb{R}$ ,
- *nevlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0 \in \mathbb{R}, L \in \{\pm\infty\}$ ,
- *vlastní limita v nevlastním bodě*, jestliže  $x_0 \in \{\pm\infty\}, L \in \mathbb{R}$ ,

## Použité pojmy

### Limitu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

nazýváme

- *vlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0, L \in \mathbb{R}$ ,
- *nevlastní limita ve vlastním bodě*, jestliže  $x_0 \in \mathbb{R}, L \in \{\pm\infty\}$ ,
- *vlastní limita v nevlastním bodě*, jestliže  $x_0 \in \{\pm\infty\}, L \in \mathbb{R}$ ,
- *nevlastní limita v nevlastním bodě*, jestliže  $x_0, L \in \{\pm\infty\}$ .



## Věta (Existence limity)

*Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  limitu právě tehdy, když má v tomto bodě obě jednostranné limity a ty si jsou rovny, tj.*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Věta (Existence limity)

*Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  limitu právě tehdy, když má v tomto bodě obě jednostranné limity a ty si jsou rovny, tj.*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Poznámka

Limita neexistuje, jestliže

- neexistuje některá (nebo obě) jednostranné limity,

## Věta (Existence limity)

*Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  limitu právě tehdy, když má v tomto bodě obě jednostranné limity a ty si jsou rovny, tj.*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Poznámka

Limita neexistuje, jestliže

- neexistuje některá (nebo obě) jednostranné limity,
- jednostranné limity jsou různé.

## Věta (Existence limity)

*Funkce  $f$  má ve vlastním bodě  $x_0$  limitu právě tehdy, když má v tomto bodě obě jednostranné limity a ty si jsou rovny, tj.*


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

## Poznámka

Limita neexistuje, jestliže

- neexistuje některá (nebo obě) jednostranné limity,
- jednostranné limity jsou různé.

Toho lze výhodně využít při důkazu neexistence limity.



Není-li možné číslo do funkce dosadit jinak než “limitně”, můžeme představu o limitním chování funkce získat i empiricky a to dosazováním blízkých čísel. Podívejme se na chování funkce  $\frac{\sin x}{x}$  pro  $x \rightarrow 0^+$ .

Není-li možné číslo do funkce dosadit jinak než “limitně”, můžeme představu o limitním chování funkce získat i empiricky a to dosazováním blízkých čísel. Podívejme se na chování funkce  $\frac{\sin x}{x}$  pro  $x \rightarrow 0^+$ .

$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001
$\frac{\sin x}{x}$	0,841470985	0,998334167	0,999983333	0,999999833	0,999999998

Není-li možné číslo do funkce dosadit jinak než “limitně”, můžeme představu o limitním chování funkce získat i empiricky a to dosazováním blízkých čísel. Podívejme se na chování funkce  $\frac{\sin x}{x}$  pro  $x \rightarrow 0^+$ .

$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001
$\frac{\sin x}{x}$	0,841470985	0,998334167	0,999983333	0,999999833	0,999999998


Z tabulky vidíme, že hodnoty se blíží jedničce. A skutečně  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ .



Není-li možné číslo do funkce dosadit jinak než “limitně”, můžeme představu o limitním chování funkce získat i empiricky a to dosazováním blízkých čísel. Podívejme se na chování funkce  $\frac{\sin x}{x}$  pro  $x \rightarrow 0^+$ .

$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001
$\frac{\sin x}{x}$	0,841470985	0,998334167	0,999983333	0,999999833	0,999999998

Z tabulky vidíme, že hodnoty se blíží jedničce. A skutečně  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ .



**POZOR** – nejde o neprůstřednou metodu:

$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	...
$\sin \frac{\pi}{x}$	0	0	0	0	0	...

**POZOR** – nejde o neprůstřednou metodu:


$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	...
$\sin \frac{\pi}{x}$	0	0	0	0	0	...

Přitom  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{\pi}{x}$  **neexistuje**.

**POZOR** – nejde o neprůstřednou metodu:

$x$	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	...
$\sin \frac{\pi}{x}$	0	0	0	0	0	...

Přitom  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{\pi}{x}$  **neexistuje**.



(Zkuste dosazovat *náhodná* čísla blížící se k nule zprava.

Např.  $\sin \frac{\pi}{0,003} \doteq -0,8660253055$ .)

# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce
- 2 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Limita funkce
  - **Spojitost funkce**
  - Výpočet limit
- 3 Příklady
- 4 Wolfram|Alpha

## Definice (Spojitost)

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

## Definice (Spojitost)

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá zleva v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

## Definice (Spojitost)

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá zleva v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

- Řekneme, že funkce  $f$  je spojitá zprava v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$ , jestliže

$$x_0 \in D(f) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$



## Definice (Spojitost na intervalu)

Řekneme, že funkce je spojitá na intervalu  $I$ , je-li spojitá v každém jeho vnitřním bodě a v krajních bodech (pokud patří do  $I$ ) je spojitá zleva, resp. zprava.

### Definice (Spojitost na intervalu)

Řekneme, že funkce je spojitá na intervalu  $I$ , je-li spojitá v každém jeho vnitřním bodě a v krajních bodech (pokud patří do  $I$ ) je spojitá zleva, resp. zprava.

### Definice (Body nespojitosti)

Body, ve kterých není funkce  $f$  spojitá, nazýváme *body nespojistosti*.

### Definice (Spojitost na intervalu)

Řekneme, že funkce je spojitá na intervalu  $I$ , je-li spojitá v každém jeho vnitřním bodě a v krajních bodech (pokud patří do  $I$ ) je spojitá zleva, resp. zprava.

### Definice (Body nespojitosti)

Body, ve kterých není funkce  $f$  spojitá, nazýváme *body nespojistosti*.

### Poznámka

Elementární funkce jsou spojité v každém bodě svého definičního oboru.

## Věta (Weierstrassova věta)

*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I$ . Pak je  $f$  na  $I$  ohraničená a nabývá zde své největší a nejmenší hodnoty.*

### Věta (Weierstrassova věta)

*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I$ . Pak je  $f$  na  $I$  ohraničená a nabývá zde své největší a nejmenší hodnoty.*

### Věta (První Bolzanova věta)

*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I = [a, b]$  a nechť platí  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Pak existuje alespoň jedno číslo  $c \in (a, b)$  takové, že  $f(c) = 0$ .*

### Věta (Weierstrassova věta)


*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I$ . Pak je  $f$  na  $I$  ohraničená a nabývá zde své největší a nejmenší hodnoty.*

### Věta (První Bolzanova věta)

*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I = [a, b]$  a nechť platí  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Pak existuje alespoň jedno číslo  $c \in (a, b)$  takové, že  $f(c) = 0$ .*

### Věta (Druhá Bolzanova věta)

*Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném intervalu  $I$ . Pak  $f$  nabývá všech hodnot mezi svou největší a nejmenší hodnotou.*



## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*



## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k,$

## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k,$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$

## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k,$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$

## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k,$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x),$

## Věta (Pravidla pro počítání s limitami)

*Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $k \in \mathbb{R}$  a necht'  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Jestliže mají funkce  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  limitu, pak platí*

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k,$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x),$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \quad \text{pro } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0.$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x) = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x) = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \cos x = -\infty \cdot 1 = -\infty,$



## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x) = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \cos x = -\infty \cdot 1 = -\infty,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \cdot e^x} = \frac{1}{\infty \cdot \infty} = 0,$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 3 \cdot 2 = 10,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x) = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \cos x = -\infty \cdot 1 = -\infty,$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \cdot e^x} = \frac{1}{\infty \cdot \infty} = 0,$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} + \ln x \right) = \infty - \infty = \text{neurčitý výraz}.$

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} = \left| \ln \infty \right| = \infty,$

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} = \|\ln \infty\| = \infty,$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} e^{-x} = \|\operatorname{arctg} \infty\| = \frac{\pi}{2},$

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} = \|\ln \infty\| = \infty,$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} e^{-x} = \|\operatorname{arctg} \infty\| = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \sin x = \|\ln 0^+\| = -\infty,$

## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} = \left\| \ln \infty \right\| = \infty,$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} e^{-x} = \left\| \operatorname{arctg} \infty \right\| = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \sin x = \left\| \ln 0^+ \right\| = -\infty,$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sin x} = \left\| \frac{1}{\sin 0^-} = \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty,$



## Věta (Limita složené funkce)

*Je-li funkce  $f$  spojitá, pak platí*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right).$$

## Poznámka

Při výpočtech limit vždy nejprve dosadíme  $x = x_0$ .

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} = \left\| \ln \infty \right\| = \infty,$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} e^{-x} = \left\| \operatorname{arctg} \infty \right\| = \frac{\pi}{2},$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \sin x = \left\| \ln 0^+ \right\| = -\infty,$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sin x} = \left\| \frac{1}{\sin 0^-} = \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty,$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} = \left\| \frac{1}{\sin 0^+} = \frac{1}{0^+} \right\| = \infty.$

# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce

- 2 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Limita funkce
  - Spojitost funkce
  - **Výpočet limit**

- 3 Příklady

- 4 Wolfram|Alpha

## Věta

Jestliže pro všechna  $x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) = g(x)$  a existuje limita

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ , pak

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

## Věta

Jestliže pro všechna  $x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) = g(x)$  a existuje limita

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ , pak

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Odtud plyne, že funkci lze při výpočtu limity vhodně upravovat.

## Věta

Jestliže pro všechna  $x \in \hat{O}_\delta(x_0)$  platí  $f(x) = g(x)$  a existuje limita

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ , pak

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Odtud plyne, že funkci lze při výpočtu limity vhodně upravovat.

## Příklad

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3.$$

Následující věta již byla použita v některých příkladech.

Následující věta již byla použita v některých příkladech.

### Věta

*Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \neq 0$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . Existuje-li prstencové okolí bodu  $x_0$ , takové, že pro každé  $x$  z tohoto okolí platí*

- $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ ,

Následující věta již byla použita v některých příkladech.

### Věta

*Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \neq 0$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . Existuje-li prstencové okolí bodu  $x_0$ , takové, že pro každé  $x$  z tohoto okolí platí*

- $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ ,
- $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$ .



Následující věta již byla použita v některých příkladech.

### Věta

*Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \neq 0$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . Existuje-li prstencové okolí bodu  $x_0$ , takové, že pro každé  $x$  z tohoto okolí platí*

- $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ ,
- $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$ .

→ Věta platí i pro jednostranné okolí a limity.

Následující věta již byla použita v některých příkladech.

### Věta

*Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \neq 0$  a  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . Existuje-li prstencové okolí bodu  $x_0$ , takové, že pro každé  $x$  z tohoto okolí platí*

- $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ ,
- $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ , pak  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$ .

→ Věta platí i pro jednostranné okolí a limity.

→ Při výpočtu limity typu  $\left\| \frac{k}{0} \right\|$ , kde  $k \neq 0$ ,  $k \in \mathbb{R}$  je potřeba určit obě jednostranné limity a zjistit, zda jsou si rovny. Pokud ne, limita neexistuje.

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty,$$

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0} \right\| = +\infty,$$

neboť

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0} \right\| = +\infty,$$

neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty,$$

## Příklad

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0} \right\|$$

neexistuje, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

- Limita

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0} \right\| = +\infty,$$

neboť

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{(x-1)^2} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = +\infty.$$



## Poznámka

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\| \frac{k}{\pm\infty}, k \in \mathbb{R} \right\| = 0.$$

## Poznámka

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\| \frac{k}{\pm\infty}, k \in \mathbb{R} \right\| = 0.$$

Věta (Limita polynomu a rac. lom. funkce v  $\pm\infty$ )

*Platí*



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n,$$

## Poznámka

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\| \frac{k}{\pm\infty}, k \in \mathbb{R} \right\| = 0.$$

Věta (Limita polynomu a rac. lom. funkce v  $\pm\infty$ )

Platí



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n,$$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \cdots + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

## Příklad

- $$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 3x^4 - 2x + 8) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5) \\ &= \|-2 \cdot (-\infty)\| = +\infty\end{aligned}$$

## Příklad

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 3x^4 - 2x + 8) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5) = \|-2 \cdot (-\infty)\| = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 1}{x^4 - 2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = \|\frac{2}{\infty}\| = 0$$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 3x^4 - 2x + 8) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5) = \|-2 \cdot (-\infty)\| = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 1}{x^4 - 2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = \|\frac{2}{\infty}\| = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{-x^2 - 8x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3) = -3$

## Příklad

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5 + 3x^4 - 2x + 8) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^5) = \parallel -2 \cdot (-\infty) \parallel = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 1}{x^4 - 2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = \parallel \frac{2}{\infty} \parallel = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{-x^2 - 8x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3) = -3$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x^2 + 2x - 1}{-4x^2 + 3x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{-4x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{-4} = \frac{1}{-4} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = -\infty.$

### Poznámka

Neurčité výrazy typu  $\frac{0}{0}$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$  lze řešit pomocí derivací – tzv. L'Hospitalova pravidla.



# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce
- 2 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Limita funkce
  - Spojitost funkce
  - Výpočet limit
- 3 Příklady
- 4 Wolfram|Alpha

## Příklad

Načrtněte graf funkce


$$f(x) = 2 - \arcsin(x + 1).$$

## Příklad

Načrtněte graf funkce

$$f(x) = 2 - \arcsin(x + 1).$$

Řešení:



## Příklad

Určete definiční obor funkce

$$f(x) = \ln \frac{x-1}{2+x} - \arcsin \frac{x}{4}.$$

## Příklad

Určete definiční obor funkce

$$f(x) = \ln \frac{x-1}{2+x} - \arcsin \frac{x}{4}.$$

Řešení:

$$D(f) = [-4, -2) \cup (1, 4].$$

# Obsah

- 1 Funkce II
  - Přehled elementárních funkcí
  - Operace s funkcemi
  - Inverzní funkce
  - Transformace grafu funkce
- 2 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Limita funkce
  - Spojitost funkce
  - Výpočet limit
- 3 Příklady
- 4 Wolfram|Alpha

- Definiční obor funkce. ⊗  
domain of  $\sqrt{x+2}/(x-1)$
- Obor hodnot funkce. ⊗  
range of  $x^2-5x+3$
- Graf funkce. ⊗ ⊗  
plot  $y=x^3-1$  for  $x$  from  $-2$  to  $2.5$   
plot  $y=\tan(x)$  for  $x$  from  $-\pi$  to  $2\pi$  and  $y$  from  $-10$  to  $10$
- Inverzní funkce. ⊗  
inverse of  $x^5$
- Průsečíky grafů funkcí. ⊗  
intersections of  $y=3x^2+x-4$  and  $y=2x+6$
- Výpočet limity. ⊗ ⊗  
limit  $(x+3)/(2-x^2)$  as  $x \rightarrow 1$   
limit  $3^{(1/x)}-7$  as  $x \rightarrow -\infty$
- Jednostranná limita. ⊗ ⊗  
limit  $e^{(\cot(x))}$  as  $x \rightarrow 2\pi$  from left  
 $\lim_{x \rightarrow (2\pi)^-} e^{(\cot(x))}$