Lesnická a dřevařská fakulta

Mgr. Miroslava Tihlaříková, Ph.D.

Konstruktivní geometrie & Deskriptivní geometrie

esf evropský sociální fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.


G1
D
H
B
I1
A
D1
H1
B1
I
G
J
KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ
miroslava tihlaříková
A1
L
C
F1
E
K1
J1
C1
F
K
L1
E1

Zobrazení bodu

1. Kótované promítání je pravoúhlé promítání na jednu průmětnu, při kterém každému průmětu bodu přiřazujeme takzvanou kótu (orientovanou vzdálenost bodu od průmětny).

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



π ... průmětna
A_1 ... průmět bodu A

Souřadnice bodu

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



(A_x, A_y, A_z) ... Kartézské souřadnice bodu A

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

stupňování přímky ... určení polohy dalších průmětů bodů o celočíselných kótách

Zobrazení přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



$a \cap \pi = P = P_1$ ... stopník přímky a

Kde leží průmět stopníku v nákresně?

stupňování přímky ... určení polohy dalších průmětů bodů o celočíselných kótách

interval přímky ... vzdálenost dvou sousedních průmětů bodů o celočíselných kótách

Sklápění přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



Budeme sklápět promítací rovinu přímky a kolem jejího průmětu a_1 do průmětny.

Sklápění přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



Budeme sklápět promítací rovinu přímky a kolem jejího průmětu a_1 do průmětny.

$(A)\ldots$ sklopený bod A

Sklápění přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



Budeme sklápět promítací rovinu přímky a kolem jejího průmětu a_1 do průmětny.

$(A)\ldots$ sklopený bod A
$|(A)(B)|\ldots$ skutečná velikost úsečky AB

Sklápění přímky

Prostorový obrázek:



Situace v nákresně:



Budeme sklápět promítací rovinu přímky a kolem jejího průmětu a_1 do průmětny.

$(A)\ldots$ sklopený bod A
$|(A)(B)|\ldots$ skutečná velikost úsečky AB
$\alpha\ldots$ odchylka přímky a od průmětny π

Speciální polohy přímky vzhledem k průmětně



Speciální polohy přímky vzhledem k průmětně

$a \perp \pi$



$a \parallel \pi$

Speciální polohy přímky vzhledem k průmětně



$a \perp \pi$

$a \parallel \pi$

Vzájemná poloha dvou přímek

Rovnoběžky:





Různoběžky:





Různoběžky:





Mimoběžky:





Příklad: Určete vzájemnou polohu přímek $a = AB$, $c = CD$.



Příklad: Určete vzájemnou polohu přímek $a = AB$, $c = CD$.



Příklad: Určete vzájemnou polohu přímek $a = AB$, $c = CD$.



Příklad: Určete vzájemnou polohu přímek $a = AB$, $c = CD$.



Hlavní roviny



- vrstevní roviny - roviny rovnoběžné s průmětnou
- ekvidistance - stejná vzdálenost (podle okolností 1cm, 1m, 2m, 5m, 50m, 100m)
- hlavní roviny - vrstevní roviny o kótách, které jsou násobky ekvidistance

Spád přímky



- $s \ldots$ spád přímky

  $s = \operatorname{tg} \alpha = \frac{e}{i}$

- pokud $e = 1 \Rightarrow$

  $i = \frac{1}{s}$

Příklad: Vystupňujte přímku a tak, aby její spád byl $s = 3/5$.



Příklad: Vystupňujte přímku a tak, aby její spád byl $s = 3/5$.



Příklad: Vystupňujte přímku a tak, aby její spád byl $s = 3/5$.



Příklad: Vystupňujte přímku a tak, aby její spád byl $s = 3/5$.



Zobrazení roviny

Prostorový obrázek



Situace v nákresně



- p^ρ ... stopa roviny - průsečnice roviny s průmětnou
- h^ρ ... hlavní přímka roviny ρ - průsečnice roviny ρ s hlavními rovinami
- s^ρ ... spádová přímka roviny ρ - přímka roviny ρ kolmá na hlavní přímky
- spád roviny ρ je roven spádu spádové přímky s^ρ

Příklad: Určete spádovou přímku roviny $\rho \equiv (a, C)$.



Příklad: Určete spádovou přímku roviny $\rho \equiv (a, C)$.



Příklad: Určete spádovou přímku roviny $\rho \equiv (a, C)$.



Příklad: Určete spádovou přímku roviny $\rho \equiv (a, C)$.



Příklad: Určete spádovou přímku roviny $\rho \equiv (a, C)$.



Příklad: Určete průsečnici rovin α a β.





Příklad: Určete průsečnici rovin α a β.





Příklad: Určete průsečnici rovin α a β.



Příklad: Určete průsečnici rovin α a β.



Průsečík přímky s rovinou - metoda krycí přímky

Prostorová situace při hledání průsečíku přímky a s rovinou ρ pomocí krycí přímky:



V nákresně nelze určit prusečík přímky a s rovinou ρ přímo. Musíme nejdříve najít přímku r, která leží v rovině ρ a jejíž průmět je totožný s průmětem přímky a. Takovou přímku nazýváme krycí přímka. Pak tedy a a r leží ve stejné promítací rovině α a jejich průsečík určíme ve sklopení.

Průsečík přímky s rovinou - metoda krycí přímky

Prostorová situace při hledání průsečíku přímky a s rovinou ρ pomocí krycí přímky:

α . . .promítací rovina přímky a

$r = \rho \cap \alpha$ . . . krycí přímka

$R = r \cap a$ . . . hledaný průsečík



V nákresně nelze určit prusečík přímky a s rovinou ρ přímo. Musíme nejdříve najít přímku r, která leží v rovině ρ a jejíž průmět je totožný s průmětem přímky a. Takovou přímku nazýváme krycí přímka. Pak tedy a a r leží ve stejné promítací rovině α a jejich průsečík určíme ve sklopení.

Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsečík přímky $p = (A, B)$ s rovinou ρ, která je daná hlavními přímkami.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.



Příklad: Určete průsek trojúhelníků ABC a KLM.